

Mucoplant

břečťanový sirup proti kašli

Sirup

Léčivá látka: suchý extrakt z brečťanového listu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje:

Vždy užívejte přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle doporučení svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Mucoplant brečťanový sirup proti kašli a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant brečťanový sirup proti kašli užívat
3. Jak se Mucoplant brečťanový sirup proti kašli užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Mucoplant brečťanový sirup proti kašli uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Mucoplant brečťanový sirup proti kašli a k čemu se používá

Mucoplant brečťanový sirup proti kašli obsahuje suchý extrakt z brečťanového listu.

Mucoplant brečťanový sirup proti kašli je rostlinný léčivý přípravek používaný na usnadnění vykašlávání hlenu při vlhkém kašli pro dospělé, dospívající a děti od 2 let věku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu věnovat pozornost, než začnete Mucoplant brečťanový sirup proti kašli používat

Neužívejte Mucoplant brečťanový sirup proti kašli

- jestliže jste alergický(á) na listy brečťanu, na rostliny z čeledi aralkovité nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Mucoplant brečťanový sirup proti kašli se nesmí podávat dětem do 2 let věku z důvodu rizika zhoršení dýchacích potíží při podávání léků, které zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání.

Upozornění a opatření

- V případě přetrvávajícího nebo vracejícího se kašle u dětí ve věku 2 – 4 let je před započítím léčby nutno stanovit diagnózu.

- V případě dýchacích obtíží, horečky, nebo hnisavého (hnis obsahující) hlenu, byste se měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Pokud se příznaky nezlepší do 7 dnů během užívání tohoto přípravku, měli byste navštívit svého lékaře.
- Nedoporučuje se užívat tento přípravek s dalšími léky, které potlačují kašel (opiátová antitusika, jako je kodein nebo dextromethorfan) bez porady s lékařem.
- Pokud máte žaludeční potíže (zánět žaludku, žaludeční vřed), je při užívání léku nutná opatrnost.

Pokud trpíte nedostatečností ledvin nebo postižením jater, poraďte se před užíváním Mucoplant brečťanový sirup proti kašli se svým lékařem nebo lékárníkem. U těchto pacientů nebylo stanoveno doporučené dávkování.

Další léčivé přípravky a Mucoplant brečťanový sirup proti kašli ve vzájemném působení s jinými léky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo žádné vzájemné působení přípravku Mucoplant brečťanový sirup proti kašli s jinými léky.

Nebyly provedeny studie na vzájemné působení mezi léky.

Přípravek Mucoplant brečťanový sirup proti kašli s jídlem a pitím

Mucoplant brečťanový sirup proti kašli lze užívat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Mucoplant brečťanový sirup proti kašli se nedoporučuje během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatečným údajům o užívání suchého extraktu z brečťanového listu u těhotných žen a kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie na účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Žádné účinky Mucoplant brečťanový sirup proti kašli na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly dosud pozorovány či hlášeny.

Mucoplant brečťanový sirup proti kašli obsahuje roztok maltitolu.


Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 10 ml sirupu obsahuje 4 g roztoku maltitolu, což odpovídá 0,3 chlebovým jednotkám. To je třeba vzít v úvahu, pokud trpíte cukrovkou. Energetická hodnota odpovídá 2,3 kcal/g maltitolu. Roztok maltitolu může mít mírný projímavý účinek.

3. Jak se Mucoplant brečťanový sirup proti kašli užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je

- pro **dospělé a dospívající od 12 let věku:** 15 ml třikrát denně.
- pro **děti od 6 do 11 let věku:** 15 ml dvakrát denně.
- pro **děti od 2 do 5 let věku:** 10 ml dvakrát denně.

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN	
Kunde:	Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Projekt:	SpHUSa_BPZ_Efeu_CZ-E2
Druckerzeugnis:	Beipackzettel
Kontur:	–
Dokumentformat:	372 x 130 mm
Auftr.-Nr.:	0818151
EAN:	–
Art.-Nr.:	01722325
Fertigw.-Nr.:	651144/1a 651145/1a
Druckfarben:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFD700; margin-right: 5px;"></div> HKS 06 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></div> black </div>
Achtung!	Bitte prüfen Sie die Daten auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen. Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.
Datum:	–
Reinzeichnung:	–
Versand an:	–
Best.-Nr.:	–
 hartmann designagentur T +49 (0)6371 528 48	

Schriftgröße: 9 pt.

- děti do 2 let věku: U dětí do dvou let věku se tento přípravek nesmí používat.

Pro přesné dávkování použijte přiloženou odměrku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: pro konkrétní doporučené dávkování neexistují dostačující údaje (viz také "Upozornění a opatření")

Mucoplant břechťanový sirup proti kašli se užívá neředěný bez ohledu na jídlo.

Při užívání Mucoplant břechťanový sirup proti kašli se doporučuje v průběhu dne pít hodně vody nebo teplých nápojů bez kofeinu. Pokud příznaky přetrvávají déle než jeden týden v průběhu užívání tohoto přípravku, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je-li účinek Mucoplant břechťanový sirup proti kašli příliš silný nebo příliš slabý, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant břechťanový sirup proti kašli, než jste měl(a)

Neužívejte větší dávky, než je doporučeno. Užívání ve větších dávkách, než je doporučeno (více než trojnásobek jednorázové dávky) může způsobit nevolnost, zvracení, průjem. Prosím, poradte se se svým lékařem, který rozhodne o nezbytné léčbě. Byl hlášen jeden případ 4letého dítěte, u něhož se po náhodném požití břechťanového extraktu odpovídajícího 1,8 g rostlinné látky (stejně množství jako u 195 ml Mucoplant břechťanový sirup proti kašli) projevila agresivita a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Mucoplant břechťanový sirup proti kašli

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny gastrointestinální nežádoucí účinky jako např. nevolnost, zvracení, průjem. Četnost výskytu není známa.

Byly hlášeny alergické reakce, jako např. kopřivka (urtikaria), kožní vyrážka, dušnost (dyspnoe) nebo anafylaktická reakce (závažná alergická reakce).

Dojde-li k alergické reakci, přestaňte léčivý přípravek užívat a neprodleně se poradte se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Mucoplant břechťanový sirup proti kašli uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za POUŽITELNÉ DO:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Léčivý přípravek lze používat 6 týdnů po otevření lahvičky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace

Co Mucoplant břechťanový sirup proti kašli obsahuje

- Jeden ml obsahuje 1,54 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Hedera helix L. folium (břechťanový list) (DER 4-8:1). Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% (m/m).
- Ostatní složky: kalium-sorbát; hyetelosa; aroma černého rybízu, roztok maltitolu (E 965); kyselina citronová; čištěná voda.

Jak Mucoplant břechťanový sirup proti kašli vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědavě žlutý, mírně zakalený sirup s charakteristickým pachem (rybíz). Mucoplant břechťanový sirup proti kašli je k dispozici v balení s obsahem 100 ml, 200 ml, 250 ml sirupu v lahvičce z hnědého skla, odměrka je přiložena.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko	Мукоплант експекторант с бръшлян 154 mg/100 ml, сироп
Česká republika	Mucoplant břechťanový sirup proti kašli
Chorvatsko	Mucoplant sirup od bršljana
Itálie	Edera Dr. Theiss
Maďarsko	Mucoplant Dr. Theiss Borostyán köhögés elleni szirup
Německo	Mucoplant Hustensaft Efeu
Litva	Helixicum sirupas
Lotyšsko	Dr. Theiss efejas sirups
Rakousko	Mucoplant Hustensaft Efeu Sirup
Rumunsko	Mucoplant iederă 1,54mg/ml sirop
Slovenská republika	Mucoplant sirup proti kašľu s brečťanom

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.02.2019